



		Puppy mini	Puppy maxi	Chicken&Rice små raser	Chicken&Rice stora raser	Regular	Lamb&Rice	Lamb&Rice Light	Breeder
Näringsvärde									
Protein	%	27	26	24	23	22	23	19	28
Fett	%	17	16	13	12	12	12	7	18
Kolhydrater (N.F.E)	%	37,5	39,5	44,1	46,1	48	46	55,2	35,4
Växtråd	%	2	2	2,4	2,4	2	2,5	2,3	2,1
Mineraler (aska)	%	6,5	6,5	6,5	6,5	6	6,5	6,5	6,5
Vatten	%	10	10	10	10	10	10	10	10
Tillsatta vitaminer (per kg)									
Vitamin A	IE	15000	15000	12000	12000	12000	12000	12000	14000
Vitamin D3	IE	1500	1500	1200	1200	1200	1200	1200	1400
Vitamin E	mg	350	350	350	350	150	350	350	175
Vitamin C	mg	200	200	200	200	100	200	200	150
Vitamin B1	mg	6	6	5	5	4	5	5	5
Vitamin B2	mg	9	9	8	8	6	8	8	9
Vitamin B6	mg	9	9	8	8	6	8	8	9
Vitamin B12	mg	0,06	0,06	0,04	0,04	0,04	0,04	0,04	0,05
Niacin	mg	38	38	30	30	25	30	30	35
Pantotensyra	mg	17	17	14	14	12	14	14	16
Folinsyra	mg	0,6	0,6	0,5	0,5	0,4	0,5	0,5	0,5
Biotin	mg	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,3
Kolin	mg	1500	1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Mineraler (per kg)									
Kalcium	%	1,2	1	1,4	1,4	1,4	1,7	1,4	1,1
Fosfor	%	0,8	0,9	1	1	1,1	1,2	1,1	1
Järn	mg	190	190	125	125	125	125	125	150
Koppar (som kopparsulfat)	mg	15	15	15	15	10	15	15	16
Mangan	mg	34	34	30	30	25	30	30	36
Zink	mg	310	310	245	245	225	225	225	280
Jod	mg	2,7	2,7	2	2	2	2	2	2,5
Selen (som natriumselenit)	mg	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,45	0,5
Extra tillsatser (per kg)									
Glukosamin	mg	-	-	750	750	650	750	750	880
Kondroitinsulfat	mg	-	-	75	75	65	75	75	88
Omsättbar energi Mj/kg									
		15,5	15,3	14,5	14,5	14,5	14,5	13,4	15,7
Förpackning									
		7 kg	10 kg	7 kg	15 kg	15 kg	15 kg	10 kg	15 kg

Anpassa mängden foder till ålder, graden av aktivitet och inte minst temperament.

Vid byte av foder bör Du successivt vänja hunden genom att blanda i allt större andel nytt foder i det gamla. Övergångstid ca 14 dagar. Byter Du foder direkt kan hunden få vissa matsmältningsproblem.

Förvaring: Canami hundfoder innehåller inga konserveringsmedel eller antimögelskydd.

Torrfooder skall alltid förvaras torrt och vid jämn temperatur, ej överstigande normal rumstemperatur. Tillslut alltid fodersäcken eller det förvaringskärl Du använder väl. Tänk på att fukt är alla torrfooders största fiende, ställ därför aldrig säcken direkt på kalla golv eller i fuktiga utrymmen.